

表 1343 大腿骨頸部骨折の既往 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	5		5		4	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	5	1	6			6
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
30～	209	22	231	2	57	290
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
40～	2,832	124	2,956	2	623	3,581
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
50～	7,049	182	7,231	7	1,531	8,769
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
60～	5,750	104	5,854	6	1,246	7,106
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
70～	2,510	29	2,539	2	506	3,047
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
80～	938	12	950	1	176	1,127
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
90～	348	2	350		78	428
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
100～	110	1	111		26	137
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
110～	49		49		8	57
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	32		32		5	37
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	19,837	477	20,314	20	4,260	24,594
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
記載なし	106	9	115	1	484	600
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
総計	19,943	486	20,429	21	4,744	25,194
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
平均	61.40	55.99	61.27	58.67	60.89	61.21
標準偏差	12.37	10.82	12.36	11.81	12.24	12.34

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査