

表 1345 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満	84	2	86		11	97
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
0.0～	1,020	72	1,092	1	227	1,320
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
1.0～	5,770	353	6,123	14	1,263	7,400
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
2.0～	11,537	470	12,007	11	2,636	14,654
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
3.0～	6,463	143	6,606	2	1,406	8,014
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
4.0～	1,784	24	1,808	1	382	2,191
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
5.0～	321	2	323	1	76	400
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
6.0～	46	1	47		12	59
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
7.0～	13	1	14		2	16
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
8.0～	25	2	27		3	30
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
合計	27,063	1,070	28,133	30	6,018	34,181
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
記載なし	153	15	168	3	619	790
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
総計	27,216	1,085	28,301	33	6,637	34,971
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
平均	2.58	2.19	2.57	2.22	2.58	2.57
標準偏差	1.02	1.25	1.03	0.83	1.03	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査