

表 1346 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満	53	1	54		4	58
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
0.0～	527	24	551		110	661
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
1.0～	2,754	102	2,856	8	577	3,441
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
2.0～	6,745	195	6,940	5	1,505	8,450
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
3.0～	5,026	94	5,120	2	1,101	6,223
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
4.0～	1,613	20	1,633	1	344	1,978
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
5.0～	303	2	305	1	69	375
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
6.0～	40	1	41		11	52
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
7.0～	11	1	12		1	13
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
8.0～	18	2	20		2	22
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
合計	17,090	442	17,532	17	3,724	21,273
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
記載なし	97	8	105	1	397	503
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
総計	17,187	450	17,637	18	4,121	21,776
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
平均	2.78	2.49	2.78	2.41	2.80	2.78
標準偏差	1.06	1.69	1.08	0.98	1.07	1.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査