

表 1348 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満	469	31	500		87	587
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
1.0～	840	48	888	1	202	1,091
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
2.0～	2,393	122	2,515	4	511	3,030
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
3.0～	5,473	229	5,702	6	1,185	6,893
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
4.0～	7,465	239	7,704	9	1,664	9,377
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
5.0～	5,843	224	6,067	8	1,349	7,424
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
6.0～	2,928	121	3,049	1	675	3,725
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
7.0～	1,120	36	1,156	1	251	1,408
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
8.0～	364	10	374		62	436
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
9.0～	153	8	161		29	190
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
合計	27,048	1,068	28,116	30	6,015	34,161
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
記載なし	168	17	185	3	622	810
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
総計	27,216	1,085	28,301	33	6,637	34,971
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
平均	4.59	4.41	4.59	4.40	4.61	4.59
標準偏差	1.59	1.68	1.59	1.34	1.54	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査