

表 1349 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	298 (95.5)	14 (4.5)	312 (100.0)		51	363
1.0～ (%)	518 (96.3)	20 (3.7)	538 (100.0)		117	655
2.0～ (%)	1,543 (97.0)	47 (3.0)	1,590 (100.0)	4	295	1,889
3.0～ (%)	3,473 (97.3)	96 (2.7)	3,569 (100.0)	3	734	4,306
4.0～ (%)	4,816 (97.8)	109 (2.2)	4,925 (100.0)	6	1,059	5,990
5.0～ (%)	3,646 (97.7)	85 (2.3)	3,731 (100.0)	2	854	4,587
6.0～ (%)	1,804 (97.4)	48 (2.6)	1,852 (100.0)	1	412	2,265
7.0～ (%)	679 (97.8)	15 (2.2)	694 (100.0)	1	145	840
8.0～ (%)	216 (98.2)	4 (1.8)	220 (100.0)		39	259
9.0～ (%)	89 (97.8)	2 (2.2)	91 (100.0)		16	107
合計 (%)	17,082 (97.5)	440 (2.5)	17,522 (100.0)	17	3,722	21,261
記載なし (%)	105 (91.3)	10 (8.7)	115 (100.0)	1	399	515
総計 (%)	17,187 (97.4)	450 (2.6)	17,637 (100.0)	18	4,121	21,776
平均	4.57	4.36	4.57	4.26	4.62	4.58
標準偏差	1.58	1.67	1.58	1.49	1.50	1.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査