

表 1350 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	171 (91.0)	17 (9.0)	188 (100.0)		36	224
1.0～ (%)	322 (92.0)	28 (8.0)	350 (100.0)	1	85	436
2.0～ (%)	850 (91.9)	75 (8.1)	925 (100.0)		216	1,141
3.0～ (%)	2,000 (93.8)	133 (6.2)	2,133 (100.0)	3	451	2,587
4.0～ (%)	2,649 (95.3)	130 (4.7)	2,779 (100.0)	3	605	3,387
5.0～ (%)	2,197 (94.0)	139 (6.0)	2,336 (100.0)	6	495	2,837
6.0～ (%)	1,124 (93.9)	73 (6.1)	1,197 (100.0)		263	1,460
7.0～ (%)	441 (95.5)	21 (4.5)	462 (100.0)		106	568
8.0～ (%)	148 (96.1)	6 (3.9)	154 (100.0)		23	177
9.0～ (%)	64 (91.4)	6 (8.6)	70 (100.0)		13	83
合計 (%)	9,966 (94.1)	628 (5.9)	10,594 (100.0)	13	2,293	12,900
記載なし (%)	63 (90.0)	7 (10.0)	70 (100.0)	2	223	295
総計 (%)	10,029 (94.0)	635 (6.0)	10,664 (100.0)	15	2,516	13,195
平均	4.63	4.43	4.62	4.59	4.60	4.61
標準偏差	1.61	1.69	1.62	1.16	1.62	1.62

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査