

表 1351 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	118	13	131		18	149
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
14～	771	83	854	2	190	1,046
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
16～	3,170	201	3,371	8	619	3,998
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
18～	6,172	268	6,440	8	1,166	7,614
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
20～	6,870	212	7,082	3	1,377	8,462
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
22～	5,339	172	5,511	3	1,057	6,571
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
24～	3,380	71	3,451	4	633	4,088
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
26～	1,837	35	1,872	3	322	2,197
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
28～	981	17	998		179	1,177
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
30～	868	20	888	1	128	1,017
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
合計	29,506	1,092	30,598	32	5,689	36,319
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	1,672	68	1,740	7	1,880	3,627
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
総計	31,178	1,160	32,338	39	7,569	39,946
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
平均	21.74	20.33	21.69	20.80	21.58	21.67
標準偏差	3.66	3.50	3.66	3.91	3.55	3.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査