

表 1352 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	34	2	36		7	43
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
14～	268	20	288	1	73	362
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
16～	1,472	71	1,543	2	302	1,847
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
18～	3,600	117	3,717	5	653	4,375
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
20～	4,614	93	4,707	2	913	5,622
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
22～	3,848	84	3,932	2	742	4,676
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
24～	2,426	38	2,464	3	442	2,909
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
26～	1,333	16	1,349	2	217	1,568
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
28～	693	9	702		113	815
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
30～	580	7	587		86	673
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
合計	18,868	457	19,325	17	3,548	22,890
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
記載なし	1,075	29	1,104	4	1,196	2,304
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
総計	19,943	486	20,429	21	4,744	25,194
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
平均	22.18	20.80	22.14	21.54	21.95	22.11
標準偏差	3.52	3.33	3.52	3.35	3.43	3.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査