

表 1353 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	84	11	95		11	106
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
14～	503	63	566	1	117	684
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
16～	1,698	130	1,828	6	317	2,151
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
18～	2,572	151	2,723	3	513	3,239
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
20～	2,256	119	2,375	1	464	2,840
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
22～	1,491	88	1,579	1	315	1,895
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
24～	954	33	987	1	191	1,179
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
26～	504	19	523	1	105	629
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
28～	288	8	296		66	362
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
30～	288	13	301	1	42	344
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
合計	10,638	635	11,273	15	2,141	13,429
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
記載なし	597	39	636	3	684	1,323
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
総計	11,235	674	11,909	18	2,825	14,752
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
平均	20.96	19.98	20.90	19.98	20.96	20.91
標準偏差	3.77	3.59	3.77	4.44	3.67	3.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査