

表 1355 大腿骨頸部骨折の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	1 (33.3)	2 (66.7)	3 (100.0)			3
2～ (%)	103 (84.4)	19 (15.6)	122 (100.0)		25	147
4～ (%)	669 (87.9)	92 (12.1)	761 (100.0)	2	155	918
6～ (%)	2,787 (90.7)	287 (9.3)	3,074 (100.0)	6	670	3,750
8～ (%)	6,880 (94.7)	387 (5.3)	7,267 (100.0)	11	1,469	8,747
10～ (%)	8,177 (97.8)	182 (2.2)	8,359 (100.0)	6	1,782	10,147
12～ (%)	5,353 (98.7)	69 (1.3)	5,422 (100.0)	4	1,212	6,638
14～ (%)	2,271 (99.0)	24 (1.0)	2,295 (100.0)	1	524	2,820
16～ (%)	838 (99.3)	6 (0.7)	844 (100.0)		204	1,048
合計 (%)	27,079 (96.2)	1,068 (3.8)	28,147 (100.0)	30	6,041	34,218
記載なし (%)	137 (89.0)	17 (11.0)	154 (100.0)	3	596	753
総計 (%)	27,216 (96.2)	1,085 (3.8)	28,301 (100.0)	33	6,637	34,971
平均	10.78	8.73	10.70	9.51	10.79	10.72
標準偏差	2.63	2.39	2.65	2.40	2.68	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査