

表 1356 大腿骨頸部骨折の既往 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	15 (93.8)	1 (6.3)	16 (100.0)		3	19
0.4～ (%)	16 (94.1)	1 (5.9)	17 (100.0)		2	19
0.6～ (%)	66 (94.3)	4 (5.7)	70 (100.0)		14	84
0.8～ (%)	480 (95.0)	25 (5.0)	505 (100.0)		113	618
1.0～ (%)	2,293 (97.0)	71 (3.0)	2,364 (100.0)	2	550	2,916
1.2～ (%)	5,959 (96.7)	203 (3.3)	6,162 (100.0)	4	1,340	7,506
1.4～ (%)	7,175 (96.3)	279 (3.7)	7,454 (100.0)	9	1,509	8,972
1.6～ (%)	5,350 (95.8)	233 (4.2)	5,583 (100.0)	8	1,082	6,673
1.8～ (%)	2,838 (95.9)	121 (4.1)	2,959 (100.0)	6	575	3,540
2.0～ (%)	2,045 (96.1)	82 (3.9)	2,127 (100.0)	1	440	2,568
合計 (%)	26,237 (96.3)	1,020 (3.7)	27,257 (100.0)	30	5,628	32,915
記載なし (%)	979 (93.8)	65 (6.2)	1,044 (100.0)	3	1,009	2,056
総計 (%)	27,216 (96.2)	1,085 (3.8)	28,301 (100.0)	33	6,637	34,971
平均	1.54	1.56	1.54	1.57	1.53	1.54
標準偏差	0.31	0.32	0.31	0.24	0.31	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査