

表 1357 大腿骨頸部骨折の既往 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	8		8		1	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
0.4～	12	1	13			13
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
0.6～	53	1	54		11	65
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
0.8～	423	16	439		94	533
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
1.0～	2,007	41	2,048	2	471	2,521
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
1.2～	4,934	123	5,057	3	1,087	6,147
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
1.4～	4,997	140	5,137	7	1,050	6,194
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
1.6～	2,676	67	2,743	2	505	3,250
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
1.8～	955	24	979	3	170	1,152
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
2.0～	529	13	542		122	664
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
合計	16,594	426	17,020	17	3,511	20,548
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
記載なし	593	24	617	1	610	1,228
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
総計	17,187	450	17,637	18	4,121	21,776
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
平均	1.45	1.45	1.45	1.47	1.43	1.44
標準偏差	0.27	0.27	0.27	0.23	0.26	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査