

表 1358 大腿骨頸部骨折の既往 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	7	1	8		2	10
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
0.4～	4		4		2	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
0.6～	13	3	16		3	19
(%)	(81.3)	(18.8)	(100.0)			
0.8～	57	9	66		19	85
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
1.0～	286	30	316		79	395
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
1.2～	1,025	80	1,105	1	253	1,359
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
1.4～	2,178	139	2,317	2	459	2,778
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
1.6～	2,674	166	2,840	6	577	3,423
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
1.8～	1,883	97	1,980	3	405	2,388
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
2.0～	1,516	69	1,585	1	318	1,904
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
合計	9,643	594	10,237	13	2,117	12,367
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
記載なし	386	41	427	2	399	828
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
総計	10,029	635	10,664	15	2,516	13,195
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
平均	1.70	1.64	1.70	1.69	1.69	1.70
標準偏差	0.31	0.32	0.31	0.19	0.33	0.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査