

表 1360 大腿骨頸部骨折の既往 equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	8 (100.0)		8 (100.0)		1	9
0.4～ (%)	25 (96.2)	1 (3.8)	26 (100.0)		6	32
0.6～ (%)	214 (95.5)	10 (4.5)	224 (100.0)		49	273
0.8～ (%)	1,510 (98.1)	30 (1.9)	1,540 (100.0)	2	346	1,888
1.0～ (%)	4,886 (97.4)	128 (2.6)	5,014 (100.0)	3	1,099	6,116
1.2～ (%)	5,750 (97.4)	153 (2.6)	5,903 (100.0)	7	1,192	7,102
1.4～ (%)	2,798 (97.6)	70 (2.4)	2,868 (100.0)	4	539	3,411
1.6～ (%)	908 (97.2)	26 (2.8)	934 (100.0)	1	174	1,109
1.8～ (%)	304 (98.7)	4 (1.3)	308 (100.0)		74	382
2.0～ (%)	198 (98.0)	4 (2.0)	202 (100.0)		33	235
合計 (%)	16,601 (97.5)	426 (2.5)	17,027 (100.0)	17	3,513	20,557
記載なし (%)	586 (96.1)	24 (3.9)	610 (100.0)	1	608	1,219
総計 (%)	17,187 (97.4)	450 (2.6)	17,637 (100.0)	18	4,121	21,776
平均	1.27	1.26	1.27	1.29	1.26	1.27
標準偏差	0.25	0.24	0.25	0.21	0.24	0.25

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査