

表 1361 大腿骨頸部骨折の既往 equilibrated Kt/V(eKt/V) 別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	7	1	8		3	11
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
0.4～	9	1	10		2	12
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
0.6～	43	7	50		13	63
(%)	(86.0)	(14.0)	(100.0)			
0.8～	231	25	256		67	323
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
1.0～	1,057	79	1,136	1	249	1,386
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
1.2～	2,349	167	2,516	2	519	3,037
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
1.4～	2,907	176	3,083	7	629	3,719
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
1.6～	1,808	80	1,888	3	372	2,263
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
1.8～	734	30	764		146	910
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
2.0～	507	29	536		119	655
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
合計	9,652	595	10,247	13	2,119	12,379
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
記載なし	377	40	417	2	397	816
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
総計	10,029	635	10,664	15	2,516	13,195
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
平均	1.49	1.43	1.49	1.46	1.47	1.48
標準偏差	0.30	0.30	0.30	0.19	0.31	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査