

表 1362 大腿骨頸部骨折の既往 nPCR(g/kg/day)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	34 (91.9)	3 (8.1)	37 (100.0)		6	43
0.4～ (%)	891 (94.8)	49 (5.2)	940 (100.0)	1	189	1,130
0.6～ (%)	7,215 (95.7)	326 (4.3)	7,541 (100.0)	7	1,525	9,073
0.8～ (%)	11,911 (96.5)	426 (3.5)	12,337 (100.0)	16	2,527	14,880
1.0～ (%)	5,184 (96.7)	179 (3.3)	5,363 (100.0)	6	1,162	6,531
1.2～ (%)	930 (96.6)	33 (3.4)	963 (100.0)		204	1,167
1.4～ (%)	107 (97.3)	3 (2.7)	110 (100.0)		18	128
1.6～ (%)	8 (80.0)	2 (20.0)	10 (100.0)		3	13
1.8～ (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
2.0～ (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		1	6
合計 (%)	26,286 (96.3)	1,021 (3.7)	27,307 (100.0)	30	5,635	32,972
記載なし (%)	930 (93.6)	64 (6.4)	994 (100.0)	3	1,002	1,999
総計 (%)	27,216 (96.2)	1,085 (3.8)	28,301 (100.0)	33	6,637	34,971
平均	0.88	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.18	0.17	0.15	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査