

表 1363 大腿骨頸部骨折の既往 nPCR(g/kg/day)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	18 (100.0)		18 (100.0)		2	20
0.4～ (%)	597 (96.4)	22 (3.6)	619 (100.0)		109	728
0.6～ (%)	4,893 (97.1)	144 (2.9)	5,037 (100.0)	5	1,037	6,079
0.8～ (%)	7,704 (97.8)	176 (2.2)	7,880 (100.0)	7	1,618	9,505
1.0～ (%)	2,895 (97.7)	69 (2.3)	2,964 (100.0)	5	644	3,613
1.2～ (%)	459 (97.5)	12 (2.5)	471 (100.0)		98	569
1.4～ (%)	41 (95.3)	2 (4.7)	43 (100.0)		5	48
1.6～ (%)	4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)			5
1.8～ (%)						
2.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)		1	3
合計 (%)	16,613 (97.5)	426 (2.5)	17,039 (100.0)	17	3,514	20,570
記載なし (%)	574 (96.0)	24 (4.0)	598 (100.0)	1	607	1,206
総計 (%)	17,187 (97.4)	450 (2.6)	17,637 (100.0)	18	4,121	21,776
平均	0.87	0.86	0.87	0.89	0.87	0.87
標準偏差	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査