

表 1364 大腿骨頸部骨折の既往 nPCR(g/kg/day)別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	16 (84.2)	3 (15.8)	19 (100.0)		4	23
0.4～ (%)	294 (91.6)	27 (8.4)	321 (100.0)	1	80	402
0.6～ (%)	2,322 (92.7)	182 (7.3)	2,504 (100.0)	2	488	2,994
0.8～ (%)	4,207 (94.4)	250 (5.6)	4,457 (100.0)	9	909	5,375
1.0～ (%)	2,289 (95.4)	110 (4.6)	2,399 (100.0)	1	518	2,918
1.2～ (%)	471 (95.7)	21 (4.3)	492 (100.0)		106	598
1.4～ (%)	66 (98.5)	1 (1.5)	67 (100.0)		13	80
1.6～ (%)	4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)		3	8
1.8～ (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
2.0～ (%)	3 (100.0)		3 (100.0)			3
合計 (%)	9,673 (94.2)	595 (5.8)	10,268 (100.0)	13	2,121	12,402
記載なし (%)	356 (89.9)	40 (10.1)	396 (100.0)	2	395	793
総計 (%)	10,029 (94.0)	635 (6.0)	10,664 (100.0)	15	2,516	13,195
平均	0.91	0.86	0.90	0.85	0.91	0.90
標準偏差	0.18	0.18	0.18	0.14	0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査