

表 1367 大腿骨頸部骨折の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	453 (85.8)	75 (14.2)	528 (100.0)		104	632
60～ (%)	385 (87.3)	56 (12.7)	441 (100.0)	2	75	518
70～ (%)	691 (90.8)	70 (9.2)	761 (100.0)	1	145	907
80～ (%)	1,036 (92.5)	84 (7.5)	1,120 (100.0)	2	217	1,339
90～ (%)	1,471 (93.5)	103 (6.5)	1,574 (100.0)	3	315	1,892
100～ (%)	1,746 (95.0)	91 (5.0)	1,837 (100.0)	1	404	2,242
110～ (%)	1,649 (96.8)	55 (3.2)	1,704 (100.0)	1	342	2,047
120～ (%)	1,224 (97.5)	32 (2.5)	1,256 (100.0)	2	264	1,522
130～ (%)	652 (96.9)	21 (3.1)	673 (100.0)		156	829
140～ (%)	360 (97.8)	8 (2.2)	368 (100.0)	1	99	468
合計 (%)	9,667 (94.2)	595 (5.8)	10,262 (100.0)	13	2,121	12,396
記載なし (%)	362 (90.0)	40 (10.0)	402 (100.0)	2	395	799
総計 (%)	10,029 (94.0)	635 (6.0)	10,664 (100.0)	15	2,516	13,195
平均	102.85	89.07	102.05	98.48	103.60	102.31
標準偏差	23.31	25.78	23.68	22.64	24.86	23.89

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査