

表 1368 大腿骨頸部骨折の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)			10
1.5～ (%)	48 (87.3)	7 (12.7)	55 (100.0)	1	6	62
2.0～ (%)	225 (90.0)	25 (10.0)	250 (100.0)	1	43	294
2.5～ (%)	1,048 (90.9)	105 (9.1)	1,153 (100.0)	6	233	1,392
3.0～ (%)	6,888 (94.9)	370 (5.1)	7,258 (100.0)	9	1,540	8,807
3.5～ (%)	16,523 (97.0)	518 (3.0)	17,041 (100.0)	14	3,530	20,585
4.0～ (%)	5,788 (98.3)	102 (1.7)	5,890 (100.0)	4	1,264	7,158
4.5～ (%)	264 (98.9)	3 (1.1)	267 (100.0)		50	317
5.0～ (%)	16 (100.0)		16 (100.0)		2	18
合計 (%)	30,809 (96.5)	1,131 (3.5)	31,940 (100.0)	35	6,668	38,643
記載なし (%)	369 (92.7)	29 (7.3)	398 (100.0)	4	901	1,303
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	3.64	3.44	3.63	3.33	3.64	3.64
標準偏差	0.39	0.44	0.39	0.55	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査