

表 1369 大腿骨頸部骨折の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	16,760 (97.0)	517 (3.0)	17,277 (100.0)	13	3,414	20,704
0.2～ (%)	5,203 (96.4)	195 (3.6)	5,398 (100.0)	5	1,074	6,477
0.5～ (%)	2,489 (95.3)	123 (4.7)	2,612 (100.0)	1	560	3,173
1.0～ (%)	1,548 (94.6)	89 (5.4)	1,637 (100.0)	5	361	2,003
2.0～ (%)	899 (94.4)	53 (5.6)	952 (100.0)		182	1,134
4.0～ (%)	305 (92.7)	24 (7.3)	329 (100.0)		78	407
6.0～ (%)	133 (95.0)	7 (5.0)	140 (100.0)	3	28	171
8.0～ (%)	67 (97.1)	2 (2.9)	69 (100.0)		25	94
10.0～ (%)	89 (93.7)	6 (6.3)	95 (100.0)		13	108
15.0～ (%)	63 (91.3)	6 (8.7)	69 (100.0)	1	14	84
合計 (%)	27,556 (96.4)	1,022 (3.6)	28,578 (100.0)	28	5,749	34,355
記載なし (%)	3,622 (96.3)	138 (3.7)	3,760 (100.0)	11	1,820	5,591
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	0.54	0.84	0.55	1.72	0.56	0.55
標準偏差	1.76	2.26	1.78	3.81	1.63	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査