

表 1371 大腿骨頸部骨折の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	877 (91.5)	81 (8.5)	958 (100.0)	1	174	1,133
3.0～ (%)	1,241 (94.2)	77 (5.8)	1,318 (100.0)		256	1,574
3.5～ (%)	2,251 (95.4)	109 (4.6)	2,360 (100.0)	5	484	2,849
4.0～ (%)	3,642 (96.2)	145 (3.8)	3,787 (100.0)	4	774	4,565
4.5～ (%)	4,545 (96.3)	174 (3.7)	4,719 (100.0)	1	992	5,712
5.0～ (%)	4,893 (96.6)	172 (3.4)	5,065 (100.0)	9	1,060	6,134
5.5～ (%)	4,238 (97.2)	123 (2.8)	4,361 (100.0)	1	937	5,299
6.0～ (%)	768 (97.3)	21 (2.7)	789 (100.0)		161	950
6.1～ (%)	2,574 (97.2)	75 (2.8)	2,649 (100.0)	5	590	3,244
6.5～ (%)	2,225 (96.9)	72 (3.1)	2,297 (100.0)	6	503	2,806
7.0～ (%)	1,449 (97.8)	32 (2.2)	1,481 (100.0)	1	293	1,775
7.5～ (%)	877 (97.2)	25 (2.8)	902 (100.0)	1	201	1,104
8.0～ (%)	532 (98.2)	10 (1.8)	542 (100.0)	1	108	651
8.5～ (%)	344 (98.3)	6 (1.7)	350 (100.0)		73	423
9.0～ (%)	540 (96.4)	20 (3.6)	560 (100.0)		122	682
合計 (%)	30,996 (96.4)	1,142 (3.6)	32,138 (100.0)	35	6,728	38,901
記載なし (%)	182 (91.0)	18 (9.0)	200 (100.0)	4	841	1,045
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	5.36	4.98	5.35	5.47	5.38	5.36
標準偏差	1.42	1.50	1.43	1.30	1.41	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査