

表 1372 大腿骨頸部骨折の既往 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,333 (94.2)	82 (5.8)	1,415 (100.0)	3	265	1,683
20～ (%)	1,719 (95.8)	76 (4.2)	1,795 (100.0)		400	2,195
40～ (%)	1,916 (95.7)	87 (4.3)	2,003 (100.0)		434	2,437
60～ (%)	2,058 (97.1)	61 (2.9)	2,119 (100.0)	5	468	2,592
80～ (%)	2,273 (96.3)	87 (3.7)	2,360 (100.0)	7	479	2,846
100～ (%)	2,202 (96.2)	88 (3.8)	2,290 (100.0)	2	503	2,795
120～ (%)	2,031 (96.0)	84 (4.0)	2,115 (100.0)	4	462	2,581
140～ (%)	1,872 (97.0)	58 (3.0)	1,930 (100.0)	2	391	2,323
160～ (%)	1,704 (96.5)	62 (3.5)	1,766 (100.0)	2	382	2,150
180～ (%)	4,018 (97.1)	120 (2.9)	4,138 (100.0)	1	866	5,005
240～ (%)	67 (98.5)	1 (1.5)	68 (100.0)		9	77
241～ (%)	2,383 (96.8)	80 (3.2)	2,463 (100.0)		492	2,955
300～ (%)	1,381 (97.5)	36 (2.5)	1,417 (100.0)		297	1,714
360～ (%)	816 (96.5)	30 (3.5)	846 (100.0)	1	195	1,042
420～ (%)	457 (97.0)	14 (3.0)	471 (100.0)		120	591
480～ (%)	119 (97.5)	3 (2.5)	122 (100.0)	1	23	146
500～ (%)	173 (95.6)	8 (4.4)	181 (100.0)		56	237
540～ (%)	197 (97.0)	6 (3.0)	203 (100.0)	1	48	252
600～ (%)	349 (97.2)	10 (2.8)	359 (100.0)	1	63	423
800～ (%)	287 (96.6)	10 (3.4)	297 (100.0)	1	52	350
合計 (%)	27,355 (96.5)	1,003 (3.5)	28,358 (100.0)	31	6,005	34,394
記載なし (%)	484 (94.7)	27 (5.3)	511 (100.0)	3	220	734
総計 (%)	27,839 (96.4)	1,030 (3.6)	28,869 (100.0)	34	6,225	35,128
平均	178.07	162.85	177.53	181.16	175.93	177.26
標準偏差	171.78	164.59	171.56	202.04	158.99	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査