

表 1374 大腿骨頸部骨折の既往 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	22	2	24		2	26
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
5～	24	4	28		3	31
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
6～	94	7	101		13	114
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
7～	356	24	380	2	63	445
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
8～	1,291	82	1,373	5	259	1,637
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
9～	4,608	189	4,797	2	1,051	5,850
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
10～	10,258	364	10,622	10	2,315	12,947
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
11～	9,214	322	9,536	7	2,034	11,577
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
12～	3,540	101	3,641	7	734	4,382
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
13～	958	28	986	1	198	1,185
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
14～	438	13	451	1	71	523
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
合計	30,803	1,136	31,939	35	6,743	38,717
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	375	24	399	4	826	1,229
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
総計	31,178	1,160	32,338	39	7,569	39,946
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
平均	10.85	10.62	10.84	10.81	10.83	10.84
標準偏差	1.27	1.39	1.28	1.62	1.19	1.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査