

表 1375 大腿骨頸部骨折の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	777 (94.5)	45 (5.5)	822 (100.0)	2	168	992
100～ (%)	2,297 (95.3)	113 (4.7)	2,410 (100.0)	7	571	2,988
120～ (%)	4,494 (96.1)	182 (3.9)	4,676 (100.0)	3	1,015	5,694
140～ (%)	5,523 (96.7)	186 (3.3)	5,709 (100.0)	3	1,193	6,905
160～ (%)	4,792 (96.8)	157 (3.2)	4,949 (100.0)	3	1,059	6,011
180～ (%)	3,078 (96.7)	104 (3.3)	3,182 (100.0)		691	3,873
200～ (%)	1,799 (97.6)	45 (2.4)	1,844 (100.0)	2	407	2,253
220～ (%)	750 (96.2)	30 (3.8)	780 (100.0)		176	956
240～ (%)	304 (97.4)	8 (2.6)	312 (100.0)	1	71	384
260～ (%)	157 (96.3)	6 (3.7)	163 (100.0)	1	52	216
合計 (%)	23,971 (96.5)	876 (3.5)	24,847 (100.0)	22	5,403	30,272
記載なし (%)	7,207 (96.2)	284 (3.8)	7,491 (100.0)	17	2,166	9,674
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	158.14	152.95	157.95	144.82	158.30	158.00
標準偏差	35.42	36.99	35.49	52.42	36.56	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査