

表 1376 大腿骨頸部骨折の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	62	3	65		16	81
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
20～	1,478	54	1,532		342	1,874
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
30～	4,872	196	5,068	7	1,056	6,131
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
40～	5,817	233	6,050	7	1,303	7,360
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
50～	4,748	170	4,918	3	1,050	5,971
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
60～	3,133	92	3,225	2	630	3,857
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
70～	1,609	42	1,651	1	371	2,023
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
80～	824	16	840		173	1,013
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
90～	345	10	355	1	75	431
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
100～	304	6	310		73	383
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
合計	23,192	822	24,014	21	5,089	29,124
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
記載なし	7,986	338	8,324	18	2,480	10,822
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
総計	31,178	1,160	32,338	39	7,569	39,946
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
平均	50.94	48.45	50.85	49.71	50.87	50.85
標準偏差	17.20	15.43	17.15	15.12	17.34	17.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査