

表 1377 大腿骨頸部骨折の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	404 (95.3)	20 (4.7)	424 (100.0)	1	104	529
50～ (%)	1,878 (96.4)	70 (3.6)	1,948 (100.0)	2	453	2,403
70～ (%)	4,045 (95.9)	172 (4.1)	4,217 (100.0)	7	914	5,138
90～ (%)	4,971 (96.7)	169 (3.3)	5,140 (100.0)	3	1,122	6,265
110～ (%)	4,058 (96.7)	137 (3.3)	4,195 (100.0)	3	964	5,162
130～ (%)	2,484 (96.8)	82 (3.2)	2,566 (100.0)		583	3,149
150～ (%)	1,247 (97.1)	37 (2.9)	1,284 (100.0)	1	312	1,597
170～ (%)	538 (95.7)	24 (4.3)	562 (100.0)		120	682
190～ (%)	203 (98.5)	3 (1.5)	206 (100.0)	1	55	262
210～ (%)	106 (97.2)	3 (2.8)	109 (100.0)		32	141
合計 (%)	19,934 (96.5)	717 (3.5)	20,651 (100.0)	18	4,659	25,328
記載なし (%)	11,244 (96.2)	443 (3.8)	11,687 (100.0)	21	2,910	14,618
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	107.13	103.70	107.01	95.39	107.64	107.12
標準偏差	33.22	33.47	33.23	38.08	33.96	33.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査