

表 1378 大腿骨頸部骨折の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
60～ (%)	89 (89.9)	10 (10.1)	99 (100.0)		16	115
80～ (%)	492 (92.7)	39 (7.3)	531 (100.0)	1	83	615
100～ (%)	2,231 (95.2)	113 (4.8)	2,344 (100.0)	4	452	2,800
120～ (%)	6,071 (96.3)	234 (3.7)	6,305 (100.0)	4	1,330	7,639
140～ (%)	9,146 (96.8)	300 (3.2)	9,446 (100.0)	7	1,980	11,433
160～ (%)	6,576 (96.9)	213 (3.1)	6,789 (100.0)	7	1,512	8,308
180～ (%)	2,495 (96.7)	84 (3.3)	2,579 (100.0)	2	573	3,154
200～ (%)	649 (96.9)	21 (3.1)	670 (100.0)		152	822
220～ (%)	175 (96.7)	6 (3.3)	181 (100.0)		35	216
合計 (%)	27,926 (96.5)	1,020 (3.5)	28,946 (100.0)	25	6,133	35,104
記載なし (%)	3,252 (95.9)	140 (4.1)	3,392 (100.0)	14	1,436	4,842
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	150.62	146.28	150.46	145.44	151.64	150.67
標準偏差	25.02	27.33	25.12	25.63	24.65	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査