

表 1379 大腿骨頸部骨折の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		2	7
20～ (%)	86 (87.8)	12 (12.2)	98 (100.0)		23	121
40～ (%)	2,115 (93.0)	159 (7.0)	2,274 (100.0)	4	402	2,680
60～ (%)	11,823 (96.0)	493 (4.0)	12,316 (100.0)	12	2,644	14,972
80～ (%)	7,174 (97.1)	214 (2.9)	7,388 (100.0)	3	1,612	9,003
90～ (%)	4,285 (97.9)	91 (2.1)	4,376 (100.0)	4	937	5,317
100～ (%)	2,185 (98.1)	42 (1.9)	2,227 (100.0)	2	472	2,701
120～ (%)	136 (98.6)	2 (1.4)	138 (100.0)		31	169
140～ (%)	10 (90.9)	1 (9.1)	11 (100.0)		1	12
合計 (%)	27,819 (96.5)	1,014 (3.5)	28,833 (100.0)	25	6,124	34,982
記載なし (%)	3,359 (95.8)	146 (4.2)	3,505 (100.0)	14	1,445	4,964
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	79.30	73.53	79.09	75.88	79.55	79.17
標準偏差	14.69	15.28	14.75	17.39	14.48	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査