

表 1382 大腿骨頸部骨折の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	57 (100.0)		57 (100.0)		40	97
15歳～ (%)	84 (100.0)		84 (100.0)	2	25	111
30歳～ (%)	440 (99.3)	3 (0.7)	443 (100.0)	3	255	701
45歳～ (%)	1,491 (98.8)	18 (1.2)	1,509 (100.0)	6	787	2,302
60歳～ (%)	2,600 (97.8)	58 (2.2)	2,658 (100.0)	23	1,353	4,034
75歳～ (%)	995 (95.8)	44 (4.2)	1,039 (100.0)	20	532	1,591
90歳～ (%)	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)	1	29	105
合計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	62.32	71.64	62.53	67.44	62.20	62.45
標準偏差	14.45	12.32	14.47	15.41	14.63	14.53

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査