

表 1383 大腿骨頸部骨折の既往 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	2,328 (98.1)	46 (1.9)	2,374 (100.0)	20	1,206	3,600
2年～ (%)	2,001 (97.4)	54 (2.6)	2,055 (100.0)	22	1,124	3,201
5年～ (%)	1,081 (97.5)	28 (2.5)	1,109 (100.0)	8	540	1,657
10年～ (%)	224 (98.7)	3 (1.3)	227 (100.0)	5	108	340
15年～ (%)	70 (98.6)	1 (1.4)	71 (100.0)		26	97
20年～ (%)	12 (100.0)		12 (100.0)		8	20
25年～ (%)	4 (66.7)	2 (33.3)	6 (100.0)		2	8
30年～ (%)	6 (100.0)		6 (100.0)		4	10
35年～ (%)	3 (100.0)		3 (100.0)			3
40年～ (%)						
合計 (%)	5,729 (97.7)	134 (2.3)	5,863 (100.0)	55	3,018	8,936
不明 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)		3	5
記載なし (%)						
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	3.11	3.44	3.11	3.38	3.06	3.10
標準偏差	3.61	4.05	3.62	3.41	3.46	3.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査