

表 1384 大腿骨頸部骨折の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	2,008	40	2,048	15	996	3,059
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	70	3	73		20	93
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	48	1	49		25	74
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	29		29		3	32
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	56	1	57		28	85
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	159	1	160	1	82	243
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
腎硬化症	711	17	728	17	338	1,083
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
悪性高血圧	71	2	73	1	33	107
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,738	44	1,782	10	974	2,766
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
SLE腎炎	41	3	44		18	62
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
アミロイド腎	4		4		5	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	22		22	1	10	33
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	12		12	1	5	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結核	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	13		13		3	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路腫瘍	9		9		5	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	13	1	14		8	22
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
骨髄腫	5		5		3	8
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	55		55		21	76
(%)	(100.0)		(100.0)			
不明	489	14	503	8	329	840
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
再導入	30	1	31		20	51
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
その他	147	6	153	1	95	249
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
合計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査