

表 1389 大腿骨頸部骨折の既往 身長(cm)別（腹膜透析患者）

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	57	1	58		4	62
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
130～	9		9		2	11
(%)	(100.0)		(100.0)			
135～	48	9	57	1	4	62
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
140～	172	11	183	4	40	227
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
145～	364	16	380	2	88	470
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
150～	685	19	704	6	157	867
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
155～	861	10	871	3	175	1,049
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
160～	1,039	23	1,062	6	262	1,330
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
165～	973	16	989	7	216	1,212
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
170～	702	13	715	6	183	904
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
175～	302	4	306		60	366
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
180～	71	1	72		15	87
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
185～	11		11	1	1	13
(%)	(100.0)		(100.0)			
190～	3		3		1	4
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	5,297	123	5,420	36	1,208	6,664
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
記載なし	434	11	445	19	1,813	2,277
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	160.55	156.07	160.44	159.58	161.09	160.56
標準偏差	11.77	12.36	11.80	11.33	10.62	11.59

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査