

表 1390 大腿骨頸部骨折の既往 身長(cm)別（腹膜透析患者 男性のみ）

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	27		27		2	29
(%)	(100.0)		(100.0)			
130～	2		2			2
(%)	(100.0)		(100.0)			
135～	5		5			5
(%)	(100.0)		(100.0)			
140～	7		7		1	8
(%)	(100.0)		(100.0)			
145～	31	2	33		7	40
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
150～	134	4	138	2	33	173
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
155～	380	3	383	2	86	471
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
160～	815	19	834	5	212	1,051
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
165～	925	16	941	7	202	1,150
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
170～	690	13	703	6	179	888
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
175～	298	4	302		60	362
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
180～	71	1	72		14	86
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
185～	11		11	1	1	13
(%)	(100.0)		(100.0)			
190～	3		3		1	4
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	3,399	62	3,461	23	798	4,282
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
記載なし	276	5	281	11	1,168	1,460
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
総計	3,675	67	3,742	34	1,966	5,742
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
平均	165.39	165.05	165.39	166.00	165.59	165.43
標準偏差	9.68	7.26	9.64	7.59	8.09	9.36

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査