

表 1391 大腿骨頸部骨折の既往 身長(cm)別 (腹膜透析患者 女性のみ)

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満 (%)	30 (96.8)	1 (3.2)	31 (100.0)		2	33
130～ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)		2	9
135～ (%)	43 (82.7)	9 (17.3)	52 (100.0)	1	4	57
140～ (%)	165 (93.8)	11 (6.3)	176 (100.0)	4	39	219
145～ (%)	333 (96.0)	14 (4.0)	347 (100.0)	2	81	430
150～ (%)	551 (97.3)	15 (2.7)	566 (100.0)	4	124	694
155～ (%)	481 (98.6)	7 (1.4)	488 (100.0)	1	89	578
160～ (%)	224 (98.2)	4 (1.8)	228 (100.0)	1	50	279
165～ (%)	48 (100.0)		48 (100.0)		14	62
170～ (%)	12 (100.0)		12 (100.0)		4	16
175～ (%)	4 (100.0)		4 (100.0)			4
180～ (%)					1	1
185～ (%)						
190～ (%)						
合計 (%)	1,898 (96.9)	61 (3.1)	1,959 (100.0)	13	410	2,382
記載なし (%)	158 (96.3)	6 (3.7)	164 (100.0)	8	645	817
総計 (%)	2,056 (96.8)	67 (3.2)	2,123 (100.0)	21	1,055	3,199
平均	151.87	146.95	151.72	148.23	152.32	151.80
標準偏差	10.06	9.44	10.08	7.12	9.43	9.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査