

表 1392 大腿骨頸部骨折の既往 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	38		38			38
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	23		23			23
(%)	(100.0)		(100.0)			
30～	140	15	155	2	15	172
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
40～	785	28	813	6	85	904
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
50～	1,388	20	1,408	17	166	1,591
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
60～	1,411	22	1,433	11	172	1,616
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
70～	706	10	716	4	91	811
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
80～	263	1	264	4	30	298
(%)	(99.6)	(0.4)	(100.0)			
90～	88		88		16	104
(%)	(100.0)		(100.0)			
100～	17		17		3	20
(%)	(100.0)		(100.0)			
110～	8		8		2	10
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	9		9			9
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,876	96	4,972	44	580	5,596
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
記載なし	855	38	893	11	2,441	3,345
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	60.73	53.48	60.59	60.13	62.12	60.74
標準偏差	13.99	12.26	14.00	11.85	13.11	13.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査