

表 1393 大腿骨頸部骨折の既往 体重(kg)別（腹膜透析患者 男性のみ）

体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	18		18			18
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	9		9			9
(%)	(100.0)		(100.0)			
30～	15	2	17		1	18
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
40～	171	4	175	1	28	204
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
50～	787	13	800	10	91	901
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
60～	1,157	19	1,176	11	142	1,329
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
70～	625	10	635	3	78	716
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
80～	243	1	244	3	26	273
(%)	(99.6)	(0.4)	(100.0)			
90～	78		78		16	94
(%)	(100.0)		(100.0)			
100～	16		16		3	19
(%)	(100.0)		(100.0)			
110～	8		8		2	10
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	6		6			6
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	3,133	49	3,182	28	387	3,597
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
記載なし	542	18	560	6	1,579	2,145
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
総計	3,675	67	3,742	34	1,966	5,742
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
平均	65.39	61.63	65.33	64.65	66.19	65.42
標準偏差	12.69	10.10	12.66	9.39	12.35	12.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査