

表 1394 大腿骨頸部骨折の既往 体重(kg)別 (腹膜透析患者 女性のみ)

体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	20 (100.0)		20 (100.0)			20
20～ (%)	14 (100.0)		14 (100.0)			14
30～ (%)	125 (90.6)	13 (9.4)	138 (100.0)	2	14	154
40～ (%)	614 (96.2)	24 (3.8)	638 (100.0)	5	57	700
50～ (%)	601 (98.8)	7 (1.2)	608 (100.0)	7	75	690
60～ (%)	254 (98.8)	3 (1.2)	257 (100.0)		30	287
70～ (%)	81 (100.0)		81 (100.0)	1	13	95
80～ (%)	20 (100.0)		20 (100.0)	1	4	25
90～ (%)	10 (100.0)		10 (100.0)			10
100～ (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
110～ (%)						
120～ (%)	3 (100.0)		3 (100.0)			3
合計 (%)	1,743 (97.4)	47 (2.6)	1,790 (100.0)	16	193	1,999
記載なし (%)	313 (94.0)	20 (6.0)	333 (100.0)	5	862	1,200
総計 (%)	2,056 (96.8)	67 (3.2)	2,123 (100.0)	21	1,055	3,199
平均	52.35	44.98	52.15	52.23	53.95	52.33
標準偏差	12.20	7.71	12.16	11.79	10.51	12.01

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査