

表 1396 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（腹膜透析患者 男性のみ）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	10	1	11		1	12
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
14～	21		21		2	23
(%)	(100.0)		(100.0)			
16～	79	1	80		5	85
(%)	(98.8)	(1.3)	(100.0)			
18～	257	4	261	4	26	291
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
20～	632	13	645	6	59	710
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
22～	776	13	789	3	103	895
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
24～	588	13	601	5	64	670
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
26～	362	3	365	3	37	405
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
28～	182		182	1	15	198
(%)	(100.0)		(100.0)			
30～	128		128	1	20	149
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	3,035	48	3,083	23	332	3,438
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
記載なし	640	19	659	11	1,634	2,304
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
総計	3,675	67	3,742	34	1,966	5,742
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
平均	23.59	22.69	23.57	23.59	23.72	23.59
標準偏差	3.37	2.78	3.37	3.08	3.34	3.36

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査