

表 1397 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（腹膜透析患者 女性のみ）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	14		14		1	15
(%)	(100.0)		(100.0)			
14～	44	1	45	1	2	48
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
16～	124	11	135		8	143
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
18～	297	9	306	2	28	336
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
20～	375	12	387	3	40	430
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
22～	313	7	320	3	43	366
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
24～	220	4	224		14	238
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
26～	143	1	144	2	10	156
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
28～	87		87		17	104
(%)	(100.0)		(100.0)			
30～	64		64	1	6	71
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	1,681	45	1,726	12	169	1,907
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
記載なし	375	22	397	9	886	1,292
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
総計	2,056	67	2,123	21	1,055	3,199
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
平均	22.36	20.22	22.31	22.73	22.75	22.35
標準偏差	3.88	2.71	3.87	4.37	3.74	3.86

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査