

表 1398 大腿骨頸部骨折の既往 BUN(mg/dL)別（腹膜透析患者）

BUN	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	22		22		7	29
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	166	7	173		10	183
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
30～	567	21	588	7	77	672
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
40～	1,168	22	1,190	14	188	1,392
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
50～	1,357	27	1,384	10	219	1,613
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
60～	959	17	976	12	162	1,150
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
70～	472	10	482	3	64	549
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
80～	210	2	212	2	31	245
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
90～	75	3	78		11	89
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
100～	30	1	31		9	40
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
110～	6	1	7			7
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
120～	6		6		1	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	5,038	111	5,149	48	779	5,976
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
記載なし	693	23	716	7	2,242	2,965
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	54.85	52.98	54.81	54.00	55.58	54.90
標準偏差	15.90	17.94	15.94	13.43	15.14	15.82

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査