

表 1399 大腿骨頸部骨折の既往 クレアチニン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	14 (93.3)	1 (6.7)	15 (100.0)		2	17
2～ (%)	126 (94.7)	7 (5.3)	133 (100.0)		21	154
4～ (%)	489 (95.3)	24 (4.7)	513 (100.0)	6	56	575
6～ (%)	963 (97.5)	25 (2.5)	988 (100.0)	13	132	1,133
8～ (%)	1,152 (97.5)	29 (2.5)	1,181 (100.0)	11	157	1,349
10～ (%)	926 (98.3)	16 (1.7)	942 (100.0)	7	166	1,115
12～ (%)	718 (99.0)	7 (1.0)	725 (100.0)	4	119	848
14～ (%)	403 (99.8)	1 (0.2)	404 (100.0)	5	79	488
16～ (%)	246 (99.6)	1 (0.4)	247 (100.0)	2	46	295
合計 (%)	5,037 (97.8)	111 (2.2)	5,148 (100.0)	48	778	5,974
記載なし (%)	694 (96.8)	23 (3.2)	717 (100.0)	7	2,243	2,967
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	9.87	7.86	9.83	9.56	10.30	9.89
標準偏差	3.52	2.88	3.52	3.44	3.54	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査