

表 1400 大腿骨頸部骨折の既往 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	10 (90.9)	1 (9.1)	11 (100.0)		4	15
1.5～ (%)	56 (94.9)	3 (5.1)	59 (100.0)	1	11	71
2.0～ (%)	245 (93.5)	17 (6.5)	262 (100.0)		36	298
2.5～ (%)	860 (97.0)	27 (3.0)	887 (100.0)	14	136	1,037
3.0～ (%)	1,820 (98.1)	36 (1.9)	1,856 (100.0)	14	288	2,158
3.5～ (%)	1,622 (98.6)	23 (1.4)	1,645 (100.0)	16	245	1,906
4.0～ (%)	370 (98.9)	4 (1.1)	374 (100.0)	2	55	431
4.5～ (%)	19 (100.0)		19 (100.0)		2	21
5.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	5,004 (97.8)	111 (2.2)	5,115 (100.0)	47	777	5,939
記載なし (%)	727 (96.9)	23 (3.1)	750 (100.0)	8	2,244	3,002
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	3.29	3.01	3.28	3.24	3.26	3.28
標準偏差	0.51	0.58	0.52	0.51	0.53	0.52

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査