

表 1401 大腿骨頸部骨折の既往 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	2,618 (98.3)	44 (1.7)	2,662 (100.0)	24	381	3,067
0.2～ (%)	827 (97.4)	22 (2.6)	849 (100.0)	11	135	995
0.5～ (%)	376 (98.2)	7 (1.8)	383 (100.0)	2	64	449
1.0～ (%)	257 (98.1)	5 (1.9)	262 (100.0)	3	43	308
2.0～ (%)	170 (96.0)	7 (4.0)	177 (100.0)	2	23	202
4.0～ (%)	68 (93.2)	5 (6.8)	73 (100.0)	1	9	83
6.0～ (%)	29 (93.5)	2 (6.5)	31 (100.0)	1	8	40
8.0～ (%)	19 (86.4)	3 (13.6)	22 (100.0)		2	24
10.0～ (%)	33 (100.0)		33 (100.0)		1	34
15.0～ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)			7
合計 (%)	4,404 (97.9)	95 (2.1)	4,499 (100.0)	44	666	5,209
記載なし (%)	1,327 (97.1)	39 (2.9)	1,366 (100.0)	11	2,355	3,732
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	0.63	1.09	0.64	0.68	0.54	0.63
標準偏差	1.77	2.02	1.78	1.43	1.19	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査