

表 1402 大腿骨頸部骨折の既往 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	23 (100.0)		23 (100.0)		6	29
7.0～ (%)	30 (96.8)	1 (3.2)	31 (100.0)		5	36
7.5～ (%)	104 (100.0)		104 (100.0)		23	127
8.0～ (%)	238 (99.2)	2 (0.8)	240 (100.0)	1	45	286
8.4～ (%)	74 (98.7)	1 (1.3)	75 (100.0)	1	10	86
8.5～ (%)	769 (98.2)	14 (1.8)	783 (100.0)	9	114	906
9.0～ (%)	1,371 (97.7)	32 (2.3)	1,403 (100.0)	15	184	1,602
9.5～ (%)	1,382 (97.9)	30 (2.1)	1,412 (100.0)	11	206	1,629
10.0～ (%)	164 (97.0)	5 (3.0)	169 (100.0)	1	21	191
10.1～ (%)	449 (97.4)	12 (2.6)	461 (100.0)	6	90	557
10.5～ (%)	243 (97.6)	6 (2.4)	249 (100.0)	1	46	296
11.0～ (%)	91 (95.8)	4 (4.2)	95 (100.0)	2	14	111
11.5～ (%)	24 (92.3)	2 (7.7)	26 (100.0)		3	29
12.0～ (%)	23 (95.8)	1 (4.2)	24 (100.0)		3	27
合計 (%)	4,985 (97.8)	110 (2.2)	5,095 (100.0)	47	770	5,912
記載なし (%)	746 (96.9)	24 (3.1)	770 (100.0)	8	2,251	3,029
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	9.40	9.60	9.40	9.45	9.41	9.41
標準偏差	0.79	0.81	0.79	0.68	0.85	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査