

表 1403 大腿骨頸部骨折の既往 リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満	99	7	106	1	19	126
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
3.0～	228	5	233	4	33	270
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
3.5～	436	12	448	5	72	525
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
4.0～	639	20	659	7	104	770
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
4.5～	802	16	818	6	97	921
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
5.0～	798	14	812	9	127	948
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
5.5～	717	15	732	3	104	839
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
6.0～	115	6	121		17	138
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
6.1～	402	4	406	3	68	477
(%)	(99.0)	(1.0)	(100.0)			
6.5～	327	7	334	3	62	399
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
7.0～	182	4	186	1	25	212
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
7.5～	129		129	2	18	149
(%)	(100.0)		(100.0)			
8.0～	57		57	2	12	71
(%)	(100.0)		(100.0)			
8.5～	31		31		7	38
(%)	(100.0)		(100.0)			
9.0～	71		71	1	17	89
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	5,033	110	5,143	47	782	5,972
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
記載なし	698	24	722	8	2,239	2,969
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	5.25	4.83	5.24	5.21	5.29	5.25
標準偏差	1.33	1.16	1.33	1.59	1.45	1.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査