

表 1404 大腿骨頸部骨折の既往 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	95 (99.0)	1 (1.0)	96 (100.0)		27	123
20～ (%)	223 (95.3)	11 (4.7)	234 (100.0)		47	281
40～ (%)	218 (99.5)	1 (0.5)	219 (100.0)	2	47	268
60～ (%)	267 (97.8)	6 (2.2)	273 (100.0)	3	39	315
80～ (%)	262 (98.9)	3 (1.1)	265 (100.0)	1	43	309
100～ (%)	255 (96.6)	9 (3.4)	264 (100.0)	1	51	316
120～ (%)	257 (98.8)	3 (1.2)	260 (100.0)	2	43	305
140～ (%)	235 (96.3)	9 (3.7)	244 (100.0)	5	36	285
160～ (%)	236 (97.1)	7 (2.9)	243 (100.0)	1	32	276
180～ (%)	549 (98.6)	8 (1.4)	557 (100.0)	1	96	654
240～ (%)	9 (100.0)		9 (100.0)		1	10
241～ (%)	367 (98.4)	6 (1.6)	373 (100.0)	2	56	431
300～ (%)	282 (97.9)	6 (2.1)	288 (100.0)	4	39	331
360～ (%)	158 (98.8)	2 (1.3)	160 (100.0)	2	38	200
420～ (%)	116 (98.3)	2 (1.7)	118 (100.0)		21	139
480～ (%)	34 (97.1)	1 (2.9)	35 (100.0)	1	7	43
500～ (%)	43 (97.7)	1 (2.3)	44 (100.0)	1	9	54
540～ (%)	59 (96.7)	2 (3.3)	61 (100.0)		12	73
600～ (%)	93 (98.9)	1 (1.1)	94 (100.0)		11	105
800～ (%)	93 (95.9)	4 (4.1)	97 (100.0)		13	110
合計 (%)	3,851 (97.9)	83 (2.1)	3,934 (100.0)	26	668	4,628
記載なし (%)	306 (97.8)	7 (2.2)	313 (100.0)	4	59	376
総計 (%)	4,157 (97.9)	90 (2.1)	4,247 (100.0)	30	727	5,004
平均	224.75	256.55	225.42	210.58	215.29	223.88
標準偏差	222.73	377.50	227.05	133.37	244.99	229.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査