

表 1406 大腿骨頸部骨折の既往 ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	6		6		1	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
5～	10		10		4	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
6～	21	2	23		5	28
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
7～	98	2	100		24	124
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
8～	268	15	283	5	56	344
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
9～	771	11	782	13	108	903
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
10～	1,437	33	1,470	11	225	1,706
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
11～	1,463	31	1,494	12	203	1,709
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
12～	672	10	682	6	108	796
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
13～	192	5	197	1	39	237
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
14～	70	2	72		7	79
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
合計	5,008	111	5,119	48	780	5,947
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
記載なし	723	23	746	7	2,241	2,994
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	10.83	10.68	10.82	10.49	10.75	10.81
標準偏差	1.40	1.55	1.41	1.24	1.49	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査