

表 1407 大腿骨頸部骨折の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	40 (97.6)	1 (2.4)	41 (100.0)		9	50
100～ (%)	123 (94.6)	7 (5.4)	130 (100.0)		30	160
120～ (%)	384 (98.2)	7 (1.8)	391 (100.0)	2	55	448
140～ (%)	671 (98.2)	12 (1.8)	683 (100.0)	10	113	806
160～ (%)	729 (98.2)	13 (1.8)	742 (100.0)	8	115	865
180～ (%)	719 (98.6)	10 (1.4)	729 (100.0)	6	98	833
200～ (%)	471 (96.7)	16 (3.3)	487 (100.0)	6	71	564
220～ (%)	279 (97.9)	6 (2.1)	285 (100.0)	3	30	318
240～ (%)	133 (97.8)	3 (2.2)	136 (100.0)		23	159
260～ (%)	121 (96.8)	4 (3.2)	125 (100.0)	1	23	149
合計 (%)	3,670 (97.9)	79 (2.1)	3,749 (100.0)	36	567	4,352
記載なし (%)	2,061 (97.4)	55 (2.6)	2,116 (100.0)	19	2,454	4,589
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	179.30	181.89	179.35	178.72	176.77	179.01
標準偏差	40.22	49.32	40.43	30.53	41.78	40.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査