

表 1408 大腿骨頸部骨折の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	7		7		1	8
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	237	7	244	2	42	288
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
30～	784	17	801	8	124	933
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
40～	832	11	843	7	140	990
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
50～	700	15	715	7	117	839
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
60～	434	11	445	2	69	516
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
70～	220		220	2	37	259
(%)	(100.0)		(100.0)			
80～	114	7	121	1	19	141
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
90～	47	4	51	1	9	61
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
100～	50	2	52	1	4	57
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
合計	3,425	74	3,499	31	562	4,092
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
記載なし	2,306	60	2,366	24	2,459	4,849
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	50.46	53.36	50.52	53.55	50.03	50.47
標準偏差	17.72	20.62	17.79	29.46	16.44	17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査